

Segre
19/05/2015

SALUT PREVENCIÓ

Detecten indicis de càncer de pell en set lleidatans en un dia

Campanya a rambla Ferran que va analitzar taques i pigues a 86 persones

R. RÍOS

LLEIDA | Detectar possibles càncers de pell en fases molt inicials per aconseguir una major probabilitat de curació. Amb aquest objectiu la Fundació Agrupació va portar ahir a Lleida, en col·laboració amb la Paeria, una campanya de prevenció d'aquesta malaltia a través d'anàlisi de la pell de forma gratuïta als ciutadans, que van permetre detectar indicis de melanoma en set dels 86 lleidatans atesos per una dermatòloga a l'equip mòbil instal·lat a rambla Ferran. Tots ells (homes i dones la bona part d'entre 25 i 45 anys) van ser sotmesos a un *screening* de la pell per observar taques, pigues o qualsevol tipus d'alteració que pugui indicar un possible càncer de pell. "En set d'ells s'han trobat taques (escatoses, amb volum o sagnants) que cal analitzar més a fons per saber si hi ha càncer de pell", va explicar Imma Playà, directora de la Fundació Agrupació. Aquestes persones han estat derivades ara al dermatòleg per a un estudi de major profunditat. "L'exposició solar és un dels principals factors de risc. Per això és fonamental modificar actituds i conductes (evitar exposar-nos entre les dotze del migdia i les quatre de la tarda i aplicar-se crema d'alta protecció, factor 30 o 50 segons



ITMAR FABREGAT

La Fundació Agrupació va efectuar ahir proves gratuïtes a Lleida.

el tipus de pell) per evitar cremades que amb el pas dels anys puguin passar factura", va alertar Payà.

Segons la Fundació Agrupació, la incidència del càncer de pell a Espanya s'ha incrementat en un 25% en els últims 4 anys, una tendència que sembla que es mantindrà en les pròximes dècades. Afecta sobretot persones majors de 50 anys, encara que cada vegada se'n detecten més casos en gent jove.

Avanç contra el càncer de còlon

■ Un estudi en què ha participat la Vall d'Hebron amb pacients de càncer colorectal metastàtic resistent a tots els tractaments estàndards ha demostrat que un agent antitumoral format per la combinació de dos fàrmacs permet millorar la supervivència d'aquests malalts en dos mesos.

El càncer colorectal és el segon tipus de càncer més comú del món, amb una incidència estimada de més d'1,36 milions de nous casos anuals. Entorn d'un 50% dels pacients amb aquest tipus de càncer desenvolupen metàstasi que, en molts casos, no responen als tractaments estàndard.